



Federaal Agentschap  
voor de Veiligheid  
van de Voedselketen

# HPAI H5N8: nieuwe maatregelen

30.10.2020

Crisispreventie en crisisbeheer



# Vaststellingen in NL

- Besmettingen met H5N8 op 3 locaties
  - Wilde vogels
    - smienten = trekvogels
    - zwanen = "lokale" vogels
  - Moederdierbedrijf
    - waarschijnlijk door insleep uit wilde vogels
- Conclusies
  - Trekroute boven BE is besmet
  - Virus circuleert in NL met besmetting van lokale vogelpopulaties

Risico van introductie in BE is reëel



# Virus

- Kenmerken
  - H5N8
  - Sterk gelijkend op H5-virussen van afgelopen jaren in EU
  - Hoogpathogeen
    - hoge morbiditeit en mortaliteit bij pluimvee, ook eenden
    - ook hoogpathogeen bij wilde vogels
  - Spreidt gemakkelijk
    - tussen wilde vogels
    - tussen pluimvee
    - van wilde vogels naar pluimvee
- Risicofactoren
  - buitenbeloop
  - personen, materiaal, kratten, voertuigen, ...



# Bijkomende maatregelen vanaf 1 november

- Periode van verhoogd risico (art. 3/5 van KB 5 mei 2008)
  - Ophokverplichting voor commercieel pluimvee
    - op stal of onder netten
    - alle pluimvee, uitgez. loopvogels
  - Hobbypluimvee en -vogels moeten verplicht afgeschermd gevoederd en gedrenkt worden
    - moet in hok of onder netten gebeuren
    - gebruik van oppervlaktewater is verboden
- Komen bovenop basispakket dat ganse jaar door van kracht is



# Basispakket

[www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp](http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp)

- Handel en markten
  - Enkel "veilig" pluimvee mag verhandeld worden
- Pluimveehouderijen
  - Bioveiligheidsmaatregelen
  - Beperken van contacten
  - Verhoogde waakzaamheid: labo-onderzoek bij afwijkende productieparameters in een stal of lot
    - voeder- en waterconsumptie daalt >20%
    - sterfte per week >3%
    - leg daalt >5% gedurende >2d
    - ziekte tekens of letsels bij post-mortem onderzoek
- Risicogebieden met veel wilde watervogels
  - Ophokken commercieel pluimvee en pluimvee van geregistreerde hobbyhouders
  - Binnen voederen/drenken alle pluimvee en vogels
  - Eenden en ganzen gescheiden houden van ander pluimvee



# Perspectieven

- Virus zal hoogstwaarschijnlijk in BE opduiken
- Rekening houden met besmettingen
  - bij wilde vogels
  - bij hobbypluimvee en/of commercieel pluimvee
- Aanpak van besmettingen = aanpak EU
  - Opruimen haard
  - Zonering (3 km / 10 km)
  - Strikte maatregelen in zones
  - Aanvullende maatregelen in rest van het land

**Voorkomen is beter dan bestrijden.  
Strikte bioveiligheid op alle niveaus is dus essentieel.**

